

## การแพ้ยา

ผศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล

ภาควิชาอายุรศาสตร์

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การแพ้ยา เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของการใช้ยาที่ควรคำนึงถึง ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกาย เปลี่ยนแปลงการตอบสนอง ต่อยา เกิดเนื่องจากเคยได้รับยาชนิดนั้น หรือได้รับสารที่มีสูตร คล้าย คลึงกันมาก่อน และเมื่อร่างกายได้รับยาซ้ำอีกครั้ง หนึ่ง จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้น อาการแพ้ที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับแทบทุกระบบของร่างกาย มีตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนรุนแรง มากถึงขั้นเสียชีวิต

ลักษณะของการแพ้ยา ที่ไม่รุนแรง อาจมีเพียงผื่นคันคล้ายลมพิษ ผิวหนังอักเสบแดง หอบหืด เป็นต้น

อาการที่รุนแรงถึงชีวิต ส่วนใหญ่มักถึงแก่กรรมเนื่องจากทางเดินหายใจตีบตัน ร่างกาย ขาดออกซิเจน อาการจะ เกิดรวดเร็วมาก ต้องรีบทำการรักษา

### การแก้ไข

1. หยุดใช้ยานั้นทันที
2. เมื่อหยุดยา ยังไม่หาย และอาการแพ้ไม่รุนแรง เช่น ผื่นคัน อาจกินยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามีน หรือใช้ยาทาเวลา ไม่นาน โดน หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
3. ในรายที่เป็นรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
4. ในกรณีที่ได้รับการรักษาจากแพทย์ เมื่อมีอาการแพ้ยาควรหยุดยาแล้ว ไปพบแพทย์

### การป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่เคยแพ้
2. เมื่อมีอาการสงสัยว่า จะแพ้ยาที่กำลังใช้อยู่ ให้หยุดยาทันที
3. ต้องแจ้งให้หมอที่ท่านไปรักษาอยู่ รู้ว่า ท่านแพ้ยาอะไร
4. อย่าซื้อยารับประทานเอง ตามคำโฆษณา

.....