

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นซิฟิลิส ?

ให้มารับการตรวจวินิจฉัย โดยการตรวจเลือด
ในทุกระยะของโรค และการตรวจหนองจากแผล
ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจดังนี้

1. การตรวจหนองจากรอยโรค โดยส่องกล้อง
Darkfield เพื่อหาตัวเชื้อ การตรวจนี้สามารถ
วินิจฉัยได้จาก แผลหรือฝื่นที่สงสัยที่เกิดในการติด
เชื้อระยะที่หนึ่ง หรือสอง

2. การตรวจเลือด เป็นการตรวจเลือดเพื่อหา
ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อซิฟิลิส มี 2 วิธี คือ

- การเจาะเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันเบื้องต้น
ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส เช่น การตรวจ
VDRL หรือ RPR

- การเจาะเลือดที่เจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส
เป็นการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัย ซึ่งผู้ที่เคยเป็น
ซิฟิลิสมาก่อน และได้รับการรักษาแล้ว อาจจะมี
มีผลบวก แม้จะไม่ใช่โรคในขณะนั้น

การตรวจจากน้ำไขสันหลัง จะทำในกรณีสงสัยว่า
มีการติดเชื้อซิฟิลิสในระบบประสาท

หากท่านมีฝื่น หรือ แผล

บริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก

ต้องการปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

โทร 02-419-7380-1

เพื่อนัดหมายการตรวจในเวลาราชการ



สแกนเพื่อประเมินความพึงพอใจ
หลังจากอ่านสื่อความรู้ด้านสุขภาพฉบับนี้

จัดทำโดย

พญ.อรุณา โพธิ์ชนะพันธ์ุ์

พญ.ญานิสรา นันทชัยพฤกษ์

นายพิภพ พลอาสา

รศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสอบเนื้อหาล่าสุด ปี 2564

รหัสหน่วยงาน DE

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ. การพิมพ์ 2537



แผ่นพับ
สุขภาพออนไลน์



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ซิฟิลิส (Syphilis)



สาขาวิชาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

ภาควิชาตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPI DE1084364

ซิฟิลิส (Syphilis)

ซิฟิลิส คืออะไร?

ซิฟิลิสเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง เกิดจากแบคทีเรีย *Treponema pallidum*

โรคนี้ติดต่อได้อย่างไร?

1. ติดต่อกับเพศสัมพันธ์ ติดต่อขณะสัมผัสเยื่อช่องคลอด ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก หรือช่องปาก
2. ติดต่อจากแม่สู่ลูก เชื้อนี้สามารถติดต่อจากแม่ไปสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์หรือระหว่างการคลอด
3. ติดต่อกับอื่น เชื้อนี้อ่อนแอและตายง่ายในสิ่งแวดล้อมทั่วไป ดังนั้นการสัมผัสมือของผู้ที่เป็นซิฟิลิสหรือการนั่งโถส้วมจะไม่เกิดการติดต่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อผิวหนังที่มีแผลสัมผัสกับแผลที่มีเชื้อซิฟิลิส มีโอกาสติดเชื้อได้

อาการของซิฟิลิสเป็นอย่างไร?

ในช่วงแรกอาจมีแผลที่อวัยวะเพศหรือไม่มีอาการใดๆก็ได้ ถ้าไม่ได้รับการ แผลดังกล่าวอาจหายเองได้ แต่ยังคงมีการติดเชื้ออยู่ และมีโอกาสที่จะเกิดผลแทรกซ้อนตามมา โรคนี้มีระยะต่างๆ คือ ซิฟิลิสระยะแรก ระยะสอง ระยะสาม และระยะแฝง



ซิฟิลิสระยะแรก (Primary syphilis)

อาการที่สำคัญในระยะนี้ คือ แผลริมแข็ง ในตำแหน่งที่ติดเชื้อซิฟิลิส ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ คือ

- มีตุ่มแดงแล้วแตกออกเป็นแผลบริเวณอวัยวะเพศ ชาย อวัยวะ ทวารหนัก ช่องคลอด หรือ ริมฝีปาก หลังจากได้รับเชื้อ 10-90 วัน
- มักเป็นแผลเดี่ยวไม่เจ็บ ขอบนูน ต่อม้ำเหลืองจะตกไม่เจ็บ
- แผลจะเป็นอยู่ 1-5 สัปดาห์ และส่วนใหญ่จะหายเอง
- การตรวจเลือดช่วงนี้ให้ผลบวกประมาณสองในสาม

ซิฟิลิสระยะที่สอง (Secondary syphilis)

อาการสำคัญในระยะนี้ คือ ผื่นที่เกิดในช่วง 2-3 สัปดาห์ หลังจากแผลริมแข็งหายแล้ว

- ผื่นมีสีแดงน้ำตาล ไม่คัน สามารถพบได้ทั่วตัวรวมทั้งบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจมีไข้และมีอาการปวดตามข้อเนื่องจากข้ออักเสบ
- ต่อม้ำเหลืองโต
- ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ
- อาการเหล่านี้จะเป็น 1-3 เดือนแล้วหายไปเอง อาจกลับเป็นซ้ำได้ในบางคน
- การตรวจเลือดในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะให้ผลบวก



ซิฟิลิสระยะแฝง (Latent syphilis)

ช่วงนี้ไม่มีอาการใดๆ เป็นได้ตั้งแต่ 2 ถึง 30 ปี หลังจากรับเชื้อ การวินิจฉัยโรคระยะนี้ทำได้โดยการเจาะเลือด บางรายอาจมีผื่นเหมือนในระยะที่สอง มารดาที่เป็นโรคในระยะนี้ เมื่อตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสสามารถติดต่อไปยังทารกได้

ซิฟิลิสระยะสาม (Tertiary syphilis)

ซิฟิลิสนี้เป็นระยะช่วง 2 ถึง 30 ปี หลังจากได้รับเชื้อ เชื้อซิฟิลิสจะทำลายอวัยวะภายในต่างๆ เช่น หัวใจและหลอดเลือดสมอง ทำให้อ่อนแรง หรือ อาจจะตาบอดได้ หากรักษาไม่ทันท่วงที อวัยวะต่างๆ จะถูกทำลาย การ

การดูแลรักษาโรคซิฟิลิส

ตรวจเลือดอาจให้ผลบวกได้ประมาณหนึ่งในสาม

1. รักษาโดยการฉีดยาปฏิชีวนะเข้ากล้ามเนื้อ หรือการรับประทานยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้การรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค
2. ตรวจเลือดเพื่อติดตามการรักษาหลังจากรักษา 3 - 6 เดือน และต้องตรวจเลือดซ้ำทุกปีหลังจากนั้น
3. ผู้ป่วยโรคนี้ ขณะมีแผลแห้งดการมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยจนกว่าแผลจะหายสนิท หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก และควรแจ้งเรื่องการติดเชื้อให้คู่นอนทราบ และให้คู่นอนมารับการตรวจคัดกรองโรค
4. โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิสอย่างสม่ำเสมอ