

ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride)



ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride) คือยาในกลุ่ม 5-alpha reductase inhibitor ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีบทบาททำให้เส้นผมมีขนาดเล็กลง และเกิดภาวะผมบางจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนเพศชาย (androgenetic alopecia) ตามมาได้

นอกจากการใช้เพื่อรักษาภาวะผมบางจากกรรมพันธุ์และฮอร์โมนเพศชายแล้ว ยาฟินาสเทอไรด์ยังใช้ในการรักษาโรคอื่นๆได้ เช่น โรคต่อมลูกหมากโต ภาวะฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไปในเพศหญิง เป็นต้น

ขนาดยาที่ใช้

ยาฟินาสเทอไรด์มี 2 ขนาดคือ

- ขนาด 1 มิลลิกรัม



- ขนาด 5 มิลลิกรัม



โดยจะต้องได้รับการสั่งยาจากแพทย์ ในขนาดที่เหมาะสมต่อโรคนั้นๆ **ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง**

ข้อห้ามใช้




1. ผู้ป่วยที่แพ้ส่วนประกอบของยา
2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร รวมถึงหญิงที่วางแผนและมีโอกาสตั้งครรภ์ เพราะอาจมีผลทำให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ
3. ผู้ที่มีโรคตับและการทำงานของตับผิดปกติ

ผลข้างเคียงของยา

1. ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ความต้องการทางเพศและปริมาณของน้ำอสุจิลดลง ซึ่งพบได้ประมาณ 3-5%ของผู้ใช้ยา ซึ่งผลข้างเคียงเรื่องนี้มักหายเป็นปกติ ภายใน 1 เดือน หลังหยุดรับประทานยา
2. มีอาการเจ็บอวัยวะ
3. เต้านมขยายใหญ่ มีก้อน เจ็บเต้านมหรือมีสารคัดหลั่งออกมาจากเต้านม
4. มีค่าการทำงานของตับผิดปกติ ดังนั้นผู้ที่รับประทานยาฟินาสเทอไรด์เป็นประจำ **จำเป็นต้องตรวจค่าการทำงานของตับ (liver function test) เป็นประจำทุกปี** และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีผลทำให้การทำงานของตับแย่ลงได้ เช่น การดื่มสุรา การรับประทานยาหรือสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อตับ เป็นต้น
5. มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งพบได้ประมาณ 3%ของผู้ใช้ยา

หากมีอาการผลข้างเคียงจากการใช้ยาฟินาสเทอไรด์ ผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องหยุดยาและรีบมาพบแพทย์ทันที



ข้อควรระวัง

1. ผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน ต้องคุมกำเนิดขณะรับประทานยาฟินาสเทอไรด์ เนื่องจากยาอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศชายของทารกในครรภ์ผิดปกติได้
2. ควรแจ้งแพทย์ในการตรวจร่างกายประจำปีว่ารับประทานยาฟินาสเทอไรด์ เนื่องจากยาจะมีผลทำให้ระดับค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ในเลือดลดต่ำกว่าปกติ
3. ควรงดบริจาคเลือดในช่วงที่รับประทานยาและหลังหยุดยาไปแล้ว อย่างน้อย 1 เดือน



สแกนเพื่อประเมินความพึงพอใจ
หลังจากอ่านสื่อความรู้ด้านสุขภาพฉบับนี้

จัดทำโดย

ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วัชรทัย

ผศ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

อ.พญ.กัณฑ์ชลิต ถนอมกิตติ

พญ.กัญญลักษณ์ มั่นพรหม

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสอบเนื้อหาครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2564

รหัสหน่วยงาน DE

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ.การพิมพ์ 2537



แผ่นพับ
สุขภาพ
ออนไลน์




สร้างเสริมสุขภาพศิริราช (สสศ.)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride)



สาขาวิชาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ภาควิชาตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPI DE1087264