



หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรับการตรวจคัดกรอง
โรคหนองใน กรุณาติดต่อได้ที่ หน่วยโรคติดต่อทาง
นรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี
(คลินิก 309)

สถานที่ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น3 ห้อง309

เวลา 07.00-15.00น.

โทร 02-419-4899 หรือ 02-419-7377

จัดทำโดย

นางชนากานต์ เกิดกลิ่นหอม

งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ที่ปรึกษา

อาจารย์นายแพทย์ชานนท์ เนื่องตัน

นางเพียงเพ็ญ ธีญะตุลย์

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวน 500 ฉบับ

พ.ศ 2556

รหัสหน่วยงาน NS 08210065661

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ. การพิมพ์ 2537



โรคหนองใน



โครงการสอนสุขศึกษาในหอผู้ป่วย
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

SIPI NS007156

หนองใน

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไนซีเรียโกโนเรีย (Neisseria Gonorrhoea) หรือ จี.ซี.(G.C.)

ระยะฟักตัว

จะเริ่มมีอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 3-5 วัน ที่พบบ่อยคือ 1-14วัน

แหล่งเชื้อ

น้ำอสุจิ ตกขาวหรือหนองจากช่องคลอดหรือปลายองคชาต

การติดต่อ

โดยการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสทางเพศกับผู้เป็นโรค

อาการ

➤ **ผู้หญิง** มีตกขาวเป็นหนอง มักมีอาการปัสสาวะขัดหรือเจ็บแสบ มีอาการอักเสบของท่อปัสสาวะ ช่องคลอด ปากมดลูก และทวารหนักอาจมีการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานอย่างรุนแรง จนเป็นหนองทำให้ท่อนำไข่ตีบตัน มีผลให้เป็นหมัน และท้องนอกมดลูกได้ เชื้อนี้สามารถแพร่เข้าสู่กระแสเลือดทำให้เกิดการอักเสบของข้อนิ้ว ข้อมือ ข้อเท้า และข้อเข่า

➤ **ผู้ชาย** มีปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ มีฝีที่ผนังท่อปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ตีบตัน ทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบ อัณฑะอักเสบ และทำให้เป็นหมันได้

การตรวจ

➤ **ผู้หญิง** แพทย์จะตรวจภายในนำตกขาวหรือหนองในช่องคลอดด้วยวิธีเฉพาะ ส่งดูเชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ และนำตกขาวหรือหนองส่งไปห้องปฏิบัติการเพื่อเพาะเชื้อ

➤ **ผู้ชาย** แพทย์จะนำหนองจากปลายองคชาตตรวจด้วยวิธีเดียวกับการตรวจในผู้หญิง

การรักษา

ต้องรักษาทั้งผู้ป่วยและคู่นอนด้วยยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีทั้งยารับประทาน และยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ไม่ควรซื้อยารับประทานเองเพราะเชื้อมีได้ง่ายหากรักษาไม่ถูกต้อง

ภาวะแทรกซ้อน

ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหนองใน อาจทำให้ทารกแรกคลอดติดเชื้อจากการคลอดผ่านช่องคลอดทำให้เกิดเยื่อปูดอักเสบ หากไม่รักษาทำให้ตาบอดได้

**** หากได้รับการรักษาแล้วมีอาการที่สงสัยว่าแพ้ยา เช่น มีผื่นคันตามตัว คลื่นไส้อาเจียน หรือมีอาการมากขึ้น ควรไปพบแพทย์ก่อนนัด**



การปฏิบัติตัวและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

1. งดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหายทั้งผู้ป่วยและคู่นอน ถ้าจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย
2. รับประทานยา หรือรับการรักษาคงครบตามแผนการรักษาของแพทย์
3. ดูแลความสะอาดร่างกาย และความสะอาดของเสื้อผ้า ชุดชั้นใน ไม่ใส่ซ้ำ ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
4. ดูแลความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งหลังขับถ่ายโดยล้างจากด้านหน้าไปด้านหลัง แล้วซับให้แห้งด้วยผ้าหรือทิชชูที่สะอาด
5. มารับการตรวจรักษาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
6. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ตกขาวมีกลิ่นเหม็น หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศ ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง
7. หากคู่นอนมีอาการนำสงสัย ควรแนะนำ พามาพบแพทย์ และใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์

