วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปและทำหน้าที่บดเคี้ยวตลอดจนมีความสวยงาม ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ฟันปลอมแบบฐานพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรงต่ำ และฟันปลอมแบบฐานโลหะซึ่งมีความแข็งแรงสูงกว่าแต่ราคาแพงกว่าฟันปลอมฐานพลาสติกประมาณ 1 เท่า

การดูแลผู้ป่วย

การใส่ฟันปลอมบางส่วนมีหลายขั้นตอน ผู้ป่วยจะต้องมาพบทันตแพทย์ ประมาณ 3-4 ครั้งโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ปากผู้ป่วยเพื่อทำแบบจำลองฟัน
2. ใส่ฟันปลอมให้ผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาและการทำความสะอาด
3. ในกรณีฟันถูกถอนไปหลายซี่ติดต่อกัน อาจต้องเพิ่มขั้นตอนการกดขี้ผึ้ง
4. นัดผู้ป่วยกลับมาตรวจภายหลังการใส่ฟันปลอม

ข้อดี

: มีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

: ผู้ป่วยสามารถทดแทนการบดเคี้ยวได้ประมาณ 80 % ของฟันธรรมชาติทั้งนี้ขึ้นกับสภาพช่องปากของผู้ป่วย

: ป้องกันฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ไม่ให้ล้มเก

: ป้องกันฟันที่เหลืออยู่ไม่ให้รับแรงมากเกินไป

ข้อด้อย

: เนื่องจากการใส่ฟันปลอมบางส่วนจำเป็นต้องยึดฟันปลอมกับฟันธรรมชาติที่เหลืออยู่ ฉะนั้นความแข็งแรงในการบดเคี้ยวอาจจะไม่เท่ากับฟันธรรมชาติ

: ในระยะแรกของการใส่ฟันปลอม ผู้ป่วยมักรู้สึกว่าฟันปลอมมีขนาดใหญ่เกะกะรวมทั้งอาจเคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงเมื่อผู้ป่วยเกิดความเคยชิน

ภาวะแทรกซ้อน

: ผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บขณะบดเคี้ยวอาหารอาจเนื่องจากฐานฟันปลอมกดจึงควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไข

จัดทำโดย

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 โทร 0-2419-7415-7

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวน 3,000 ฉบับ

ปี พ.ศ. 2556

รหัสหน่วยงาน 13000400

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ.การพิมพ์ 2537

" ฟันปลอมบางส่วน ชนิดถอดได้ "

งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช

SIPI DD1002157