



แผ่นพับ
สุขภาพ
ออนไลน์



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ท่านที่ต้องการปรึกษาโรคเส้นผม

ติดต่อได้ที่

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง

โรงพยาบาลศิริราช

โทร. 02-4197380-1

เพื่อขอรับการตรวจในเวลาราชการ

หรือ

โทร. 02-4199801

เพื่อนัดหมายการตรวจ

จัดทำโดย

สาขาวิชาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่ปรึกษา

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย
อ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสอบเนื้อหาครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.2560
รหัสหน่วยงาน DE

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ.การพิมพ์ 2537

Finasteride



คลินิกโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ภาควิชาตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPI DE1023160

ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride)

ขนาดยา

ยารับประทาน มี 2 ขนาด

1 มิลลิกรัม

และ

5 มิลลิกรัม

กลไกการออกฤทธิ์

ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride) เป็นยาในกลุ่ม 5-alpha reductase inhibitors ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะผมบางจากฮอร์โมนและ

ข้อบ่งชี้การใช้ยา

- โรคต่อมลูกหมากโต
- ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชาย (androgenetic alopecia)
- ภาวะฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไปในเพศหญิง
- โรค frontal fibrosing alopecia

ข้อห้ามใช้

- แพ้ส่วนประกอบของยา
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
- ผู้มีโรคตับหรือความผิดปกติของการทำงานของตับ



ผลข้างเคียง

- ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (<2.5%) ความต้องการทางเพศและปริมาณของน้ำกามลดลง โดยอาการเหล่านี้จะกลับเป็นปกติหลังจากหยุดยา
- เจ็บอวัยวะ
- เต้านมขยายใหญ่ มีก้อน เจ็บเต้านม หรือมีสารคัดหลั่งออกมาจากเต้านม

คำเตือน

- หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน ต้องคุมกำเนิดขณะรับประทาน Finasteride เนื่องจากยาอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพศชาย ให้มีอวัยวะเพศที่ผิดปกติ
- ควรแจ้งแพทย์ในการตรวจร่างกายประจำปีว่ารับประทานยาตัวนี้ เนื่องจากยาจะลดระดับค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ให้ต่ำกว่าปกติ



ผมกินยาปลูกผม
Finasteride ครับ

