

หลังการวางยาสลบ

☞ เด็กจะรู้สึกตัว และถูกเคลื่อนย้ายไปยังห้องพักฟื้น โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลต่อเนื่อง

☞ เมื่อเด็กรู้สึกตัวดี จึงจะเริ่มให้ดื่มน้ำ นม หรือรับประทานอาหารได้ตามที่แพทย์สั่ง

☞ ดูแลแผลและให้ยาแก่เด็กตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาล

☞ การรักษาด้วยเลเซอร์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตสติปัญญา และพัฒนาการของเด็ก เด็กอาจร้องไห้กวน งอแง หรือฝันร้ายได้ แต่อาการจะหายเป็นปกติใน 1-2 วัน

☞ เด็กสามารถรับวัคซีนได้ตามกำหนด



การเปิดให้บริการ

คลินิกปานแต่กำเนิด

การบริการ : ตรวจรักษา ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน
(โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า)

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.00-9.00 น.

โทรศัพท์ : 02-4199933

ห้องผ่าตัดเด็ก

สถานที่ : ห้องผ่าตัดเด็ก 507 ตึกสยามินทร์ ชั้น 5

การบริการ : ทุกวันพุธที่ 1 และ 4 ของทุกเดือน

เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

โทรศัพท์ : 02-4197922



แผ่นพับ
สุขภาพ
ออนไลน์

Birthmark clinic

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการคลินิกปานแต่กำเนิด

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจสอบเนื้อหาครั้งสุดท้าย พ.ศ.2560

รหัสหน่วยงาน DE

สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ. การพิมพ์ 2537



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช

ภาควิชาตจวิทยา

เรื่องน่ารู้...เมื่อเด็ก
ต้องดมยาสลบ

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช

ภาควิชาตจวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

SIPI DE1018160

การรักษาปานแต่กำเนิดด้วยเลเซอร์

การรักษาปานแต่กำเนิด ด้วยแสงเลเซอร์ในเด็กบางราย จำเป็นต้องระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบเพื่อให้เด็กหลับ ไม่รับรู้ต่อความกลัวและความเจ็บ จึงทำให้แพทย์สามารถทำการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

เมื่อเด็กต้องถูกวางยาสลบ

เพื่อรักษาปานแต่กำเนิดด้วยเลเซอร์

การวางยาสลบทำได้อย่างไร

การระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบ ทำได้ด้วยการให้ยาทางการสูดดม โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด



การวางยาสลบในเด็ก

การเตรียมตัว

✍️ ดื่มน้ำ นม และอาหาร ก่อนการวางยาสลบ 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการล้าอาหารในระหว่างการวางยา ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

✍️ เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

- ดนมแม่ ก่อนการวางยาสลบ 4 ชั่วโมง

- ดนมวัวและอาหารก่อนการวางยาสลบ 6 ชั่วโมง



ผู้ปกครองสามารถให้เด็กดื่มน้ำ น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีกากได้ เช่น น้ำแอปเปิ้ล น้ำองุ่น จนถึงเวลา ก่อนเริ่มวางยาสลบ 2 ชั่วโมง

หากเด็กงดนม และ อาหารไม่ได้ตามกำหนด ต้องแจ้งให้พยาบาลห้องผ่าตัดทราบทันที โดยระบุ ชนิด ปริมาณ และเวลาที่รับประทาน

กรณีที่เด็กเป็นไข้ไม่สบายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันนัดหมายกรุณาติดต่อปรึกษาศูนย์ปานแต่กำเนิด ก่อนถึงวันนัดหมายยิงเลเซอร์ในห้องผ่าตัด

ทีมแพทย์และพยาบาลจะดูแลเด็ก

อย่างใกล้ชิด โดยมีอุปกรณ์ช่วยติดตามภาวะต่างๆ ได้แก่

✍️ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ โดยติดปุ่มสัญญาณเล็กๆ 3 อัน บนหน้าอก และมีสายต่อไปยังตัวเครื่อง

✍️ เครื่องวัดความดันเลือด โดยจะพันผ้าสำหรับวัดที่แขน หรือขาของเด็ก และบีบลมเข้าไปอย่างช้าๆ เด็กอาจรู้สึกแน่นที่แขน หรือขาขณะวัดช่วงสั้นๆ

✍️ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง โดยติดที่หนีบหรือห้วงเล็กๆ บนปลายนิ้ว และมีสายต่อไปยังเครื่องวัด

