

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelets)

เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดได้แก่

- Aspirin (แอสไพริน)
- Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)
- Ticagrelor (ไทคากริลอร์)
- Ticlopidine (ทีโคลพิดีน)
- Cilostazol (ไซลอสตาซอล)
- Dipyridamole (ไดไพริดาโมล)

ข้อบ่งใช้

- ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง
- ป้องกันการเกิดซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน

สมุนไพรที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด

สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
(Andrographis)



เทียนสัตตบุษย์
(Anise)



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

รากแอสทรากาลัส
(Astragalus)



สาหร่ายทะเลแบลด์เดอร์แวร์ค
(Bladderwrack)



ผลบิลเบอร์รี่
(Bilberry)



แบล็คเคอร์แรนท์
(Black currant)



สารสกัดจากพริก
(Capsaicin)



เหยี่ยวชัชวาลย์/ เล็บวิฬาร์
(Cat's claw)



สารสกัดจากขึ้นฉ่าย
(Celery)



น้ำมันกานพลู
(Clove oil)



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

สารสกัดจากขมิ้นชัน
(Curcumin)



น้ำมันอีฟนิงพริมโรส
(Evening primrose)



สารสกัดจากกระเทียม
(Garlic)



สารสกัดจากขิง
(Ginger)



สารสกัดจากใบแปะก๊วย
(Ginkgo)



สารสกัดจากโสม
(Ginseng)



สารสกัดจากชะเอมเทศ
(Licorice)



น้ำมันปลา
(Fish oil)



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

สมุนไพรที่อาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยาต้านเกล็ดเลือด

เกรปฟรุ๊ต (Grapefruit)

- อาจมีผล ลด ฤทธิ์ของยา Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)
- อาจมีผล เพิ่ม ฤทธิ์ของยา Ticagrelor (ไทคากริลอร์)



เซนต์จอห์นเวิร์ต (St John's Wort)

- อาจมีผล ลด ฤทธิ์ของยา Ticagrelor (ไทคากริลอร์)
- อาจมีผล เพิ่ม ฤทธิ์ของยา Clopidogrel (โคลพิโดเกรว)



สารสกัดจากมะขาม (Tamarind)

- อาจ เพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงจากยา Aspirin (แอสไพริน) เช่น อาการเลือดออก คลื่นไส้ อาเจียน



สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใช้สมุนไพรดังกล่าว หากท่านได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอยู่
- หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สมุนไพรดังกล่าว ควรแจ้งให้แพทย์ที่รักษาทราบก่อน รวมถึงท่านควรทราบผลที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในผลของความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกที่เพิ่มขึ้นหรือผลที่ทำให้ประสิทธิภาพของยาต้านเกล็ดเลือดที่ลดลง ทั้งนี้ขึ้นกับผลของสมุนไพรแต่ละชนิดดังที่กล่าวมา
- หากมีความประสงค์ที่ต้องการใช้สมุนไพรอื่นๆ ขณะที่ท่านได้รับยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หากสังเกตพบความผิดปกติระหว่างการใช้อย่างยาต้านเกล็ดเลือด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
- หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามหน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 02-419-7007 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง

1. www.micromedexsolutions.com
2. Stockley's Herbal Medicine Interaction.1st ed. 2009. (จัดทำข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2559)

โครงการพัฒนาชุดความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

จัดทำโดย

- หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

ที่ปรึกษา

- อาจารย์ นายแพทย์สงคราม โชติกอนูชิต
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สนับสนุนการพิมพ์โดย


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบโดย งานสร้างเสริมสุขภาพ

ตรวจสอบเนื้อหาครั้งล่าสุดปี พ.ศ. 2560
รหัสหน่วยงาน HP
สงวนลิขสิทธิ์โดย พ.ร.บ. การพิมพ์ 2537



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมุนไพรที่มีผลต่อยาต้านเกล็ดเลือด



โดยความร่วมมือระหว่าง

- ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
- ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
- งานสร้างเสริมสุขภาพ

SIPI HP1006160