


การตั้งครรภ์นอกมดลูก คือ การตั้งครรภ์ที่ไข่และอสุจิปฏิสนธิกันแล้วตัวอ่อนไม่ได้ไปฝังตัวอยู่บริเวณโพรงมดลูกตามปกติ โดยจะพบการฝังตัวที่บริเวณท่อนำไข่ได้มากที่สุด (ร้อยละ95)

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

- มีความผิดปกติของท่อนำไข่แต่กำเนิด
- การอักเสบของปีกมดลูกหรือท่อนำไข่
- การเกิดพังผืดบริเวณรอบท่อนำไข่จากการอักเสบติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน/การผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน
- เคยมีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อน
- การใช้ห่วงคุมกำเนิด
- การมีเยื่อมดลูกเจริญผิดที่บริเวณท่อนำไข่
- การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
- การสูบบุหรี่
- การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การกระตุ้นการตกไข่ด้วยฮอร์โมน การทำกิฟท์/เด็กหลอดแก้ว เป็นต้น



ที่มา : <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIG-g1XXGEZB0bQ5qHLsa8TiTXjTFR6cCToanJoVygCB02SPE13A>

อาการและอาการแสดง

- ขาดประจำเดือน
- ปวดท้อง ลักษณะของการปวดมักเป็นลักษณะบีบรัดเป็นพักๆ
- มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
- ในรายที่อาการรุนแรงจะมีภาวะช็อกจากการตกเลือดในช่องท้อง จะมีอาการปวดท้องน้อยร้าวไปที่ไหล่เหนือออก ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว หหมดสติ

การตรวจวินิจฉัย

- จากการซักประวัติ อาการและอาการแสดง
- การตรวจทางหน้าท้อง มีการกดเจ็บบริเวณท้องน้อย
- การตรวจภายใน ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บในอุ้งเชิงกรานเมื่อโยกปากมดลูกไปมา
- การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงทางหน้าท้องและทางช่องคลอด ไม่พบตัวอ่อนอยู่ในมดลูก
- การตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์
- การตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์
- การส่องกล้องทางหน้าท้องเพื่อการวินิจฉัย

การรักษาด้วยเคมียาเมโทเทริกเซต (Methotrexate)

เป็นการฉีดยาเพื่อไม่ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตและสามารถฝ่อไปได้เอง จะใช้ในกรณีที่ตัวอ่อนมีขนาดเล็ก มีอายุครรภ์น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ก้อนยังไม่แตกและตรวจไม่พบการเต้นของหัวใจทารก

การรักษาด้วยการผ่าตัด

เป็นการรักษาโดยผ่าตัดตัวอ่อนที่ฝังตัวผิดที่ออก สามารถทำผ่าตัดได้ทั้งแบบเปิดหน้าท้องหรือแบบส่องกล้องผ่านหน้าท้อง วิธีการรักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วย อายุ ความต้องการมีบุตร ระดับความรุนแรงของอาการ ความชำนาญของแพทย์ ความพร้อมของอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง กรณีมีการตกเลือดในช่องท้องหรือมีภาวะช็อก ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการช่วยหยุดเลือดที่ออกในท้อง

การผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง เป็นการผ่าตัดทางเลือกกรณีไม่มีการตกเลือดในช่องท้องและมีความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ในการผ่าตัด



ที่มา : https://th.pngtree.com/freepng/surgery_2756018.html

ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดครั้งใหม่และท่อนำไข่ออก
หนึ่งข้าง และยังมีเหลือรังไข่และท่อนำไข่เพียงข้างเดียว ผู้ป่วย
ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
หอผู้ป่วย อาคาร100ปี สมเด็จพระศรีฯชั้น11/1
โรงพยาบาลศิริราช โทร.02-4194681-2



ผ่านพ์
สุขภาพ
ออนไลน์

การดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

- เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แพทย์จะใช้วัสดุปิดแผลเป็นชนิดกั้นน้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้
- แพทย์จะนัดมาเปิดผ้าปิดแผล/ตัดไหม 7-10 วันหลังผ่าตัด และนัดตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด 1 เดือน
- สังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ เช่น มีไข้สูง ปวดท้องมาก แผลผ่าตัดอักเสบ บวม แดง มีเลือดซึม มีเลือดออกทางช่องคลอดมากผิดปกติ
- งดการมีเพศสัมพันธ์ 6 สัปดาห์หรือจนกว่าจะตรวจหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
- ควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 3 เดือน
- หลีกเลี่ยงการลงแช่ในอ่างอาบน้ำ/แม่น้ำ/ลำคลอง
- หลีกเลี่ยงการยกของหนัก (เกิน5กก.) ใน 4 สัปดาห์แรก
- สามารถทำงานเบาๆได้ เช่น ทำอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน

จัดทำโดย

นางสาวพรนิตา ขจรดำรงเชิดกุล พยาบาลวิชาชีพ
หอผู้ป่วย อาคาร100ปี สมเด็จพระศรีฯชั้น11/1

ที่ปรึกษา

- 1.รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- 2.นางสาววัลลีย์ ศรีตงกิม
หัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ
- 3.นางสาวมาลี งามประเสริฐ พยาบาลผู้ชำนาญการพิเศษ

สนับสนุนการพิมพ์โดย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ตรวจสอบเนื้อหาครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. 2561
รหัสหน่วยงาน NS 08210126164
สงวนลิขสิทธิ์ โดย พรบ.การพิมพ์ 2537

หลังการรักษา เมื่อสงสัยว่าตั้งครรภ์ใหม่ ควรรีบมา
ฝากครรภ์ทันทีเพราะหากมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกช้า
แพทย์จะสามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ทันทั้งนี้



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy)



ที่มา : [http://cdn2.hubspot.net/hub/389004/file-3930562716-jpg/
blog-files/ectblog.jpg?t=1524488270397](http://cdn2.hubspot.net/hub/389004/file-3930562716-jpg/blog-files/ectblog.jpg?t=1524488270397)

โครงการสอนสุขศึกษาในหอผู้ป่วย
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

SIPI NS1055161